



يمكن تشخيص الحالة بسهولة بعد الأسبوع الثاني عشر من الحمل

٧٠٪ من الحالات تنتهي بالوفاة لانتقال الدم من أحد الأجنة للآخر

التشخيص المبكر يساعد الباحثين على وضع بعض الحلول لحالات معينة

جراحة الاطفال ولحبيته للاطفال: انه بالنسبة لفصل التوائم والتي بدأت معه منذ بداية عام 1991م، عندما طلب منه مساعدة توأم ملتصق حيث كان والداه يعانيان من هذه المشكلة الجسيمة وايماننا منه بأن قدرات وطنه تستطيع أن تنافس في علاج هذه الحالات المعقدة، وبعد النجاح بدأت مسيرة الخبرة تزداد تدريجياً بنجاح .

فائدة التشخيص المبكر

وأوضح د. الربيعه ان التصاق الأجنة (التوائم السيامية) يعتبر من العيوب الخلقية المعقدة، ونظرا للتطور الكبير في التقنية الطبية أصبح من الممكن تشخيص هذه الحالات في بداية الحمل بعد الأسبوع الثاني عشر. ومن المؤكد أن التشخيص المبكر يساعد على وضع خطة علاج مبكرة وتساعد الباحثين لوضع بعض الحلول لحالات معينة من التوائم الملتصقة وفي بعض الدول الغربية يسمح بإجهاض الأم الحامل بتوأم سيامي إذا ما تم تشخيصه مبكراً وكانت الحالة مستعصية، كما أن هناك بعض المحاولات للعلاج داخل الرحم والتي هي في طور البحث .

التقنيات الحديثة في فصل التوأم

وعن ماوصل العلم اليوم في عمليات فصل التوائم قال الربيعه :التطوير مستمر في عمليات فصل التوائم السيامية ومن مستجدات هذا المجال البحوث للعمليات أثناء الحمل، وإجهاض التوائم السيامية في بداية الحمل في الدول الغربية وإجراء جراحات الفصل المستعجلة قبل فصل المشيمة وغير ذلك .